Материя и познание.

Сознание

Зрение
Слух
Обоняние
Вкус
Осязание

Приборы и
инструменты

Материя

Объективная реальность

Классическая механика. Координата и импульс.

Зрение
Слух
Осязание

скорость $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

импульс $\vec{p} = m\vec{v}$

момент
импульса $\vec{l} = [\vec{r} \vec{p}]$

ускорение $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

Третий закон Ньютона $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

Второй закон Ньютона $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$

Классическая молекулярная физика. Необратимость и статистический подход.

Уравнение Менделеева-Клайперона

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

Скорость звука в идеальном газе

$$v_s^2 = \frac{C_P}{C_V} \frac{R}{M} T$$

Функции распределения

$$f(\vec{r}, \vec{p}, t) \quad f(\vec{r}_1, \vec{r}_1, \dots, \vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, t)$$

энтропия

$$S = k_B \ln \Gamma$$

Неубывание энтропии

$$\frac{dS}{dt} \geq 0$$

Классическая оптика и электродинамика. Корпускулярно-волновой дуализм.

ФТЛ: собирающая линза, действительное изображение

$$\begin{cases} \frac{h'}{h} = \frac{f}{d} \\ \frac{h'}{h} = \frac{f - F}{F} \\ \frac{f}{d} = \frac{f - F}{F} \\ \frac{f}{d} = \frac{f}{F} - 1 \\ \frac{1}{d} = \frac{1}{F} - \frac{1}{f} \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}}$$

Сила Лоренца

Сила Лоренца – сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу.

$F_{Л} = qvB \sin \alpha$
 $F_{Л} = qvB \cos \beta$

$F_{Л} = 0 \quad \text{cos} \quad \alpha = 0^\circ \quad (\beta = 90^\circ)$
 $F_{Л} = F_{Л \text{ max}} = qvB \quad \text{cos} \quad \alpha = 90^\circ \quad (\beta = 0^\circ)$

Волновые свойства электронов. Дифракция рентгеновского излучения и электронов.

2. The diffraction pattern on the left of Fig. 2 is obtained by passing X-ray through a thin metal film. The right image is the electron diffraction pattern of the same metal foil. Using the ratio method, find out the lattice structure of the metal film.

Невозможность построения классической модели атома.

Мощность излучения в единицу времени

$$I = \frac{\mu_0 e^2 a^2}{6 \pi c} = 3,6 \cdot 10^{11} \text{ эВ/с}$$

Ускорение электрона

$$a = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 a_B^2 m_0} = 10^{23} \text{ м/с}^2$$

Квантовая механика. Состояние квантовой системы (квантовой частицы) и измерение физических величин.

Классический объект

Величина

Взаимодействие

Квантовый объект

Волновая функция (функция состояния) и операторы физических величин. Вероятностное описание квантовых систем и объектов. Плотность вероятности.

Многочастичная волновая функция

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, t)$$

$$\hat{x} = x \quad \hat{U}(\vec{r}) = U(\vec{r}) \quad \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad \hat{T} = \frac{\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2}{2m}$$

$$w(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2 \quad W(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, t) = |\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, t)|^2$$

$$\bar{x} = \int \psi^* \hat{x} \psi d^3 r$$

$$\bar{f} = \int \psi^* \hat{f} \psi d^3 r$$

Кот Шрёдингера. Необратимость вероятностного описания. “Отношения” квантовой и классической механики.

Уравнение Шредингера. Стационарные и нестационарные состояния. Плотность потока вероятности.

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} \qquad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \qquad i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + U \psi$$

Нестационарное

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, t)$$

$$W(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, t)$$

Стационарное

$$W(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots)$$

$$W(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, t) \qquad \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, t) = \Psi_s(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots) \exp\left(i \frac{E}{\hbar} t\right) \qquad \hat{H} \Psi_s = E \Psi_s$$

Собственные функции $\hat{f} \Psi = f \Psi$

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + U \psi$$

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^* + U \psi^*$$

$$\frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} = -\text{div} \left[\frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \right]$$

$$\vec{j}_w = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

Волновая функция свободного электрона и электрона в атоме водорода

Свободный электрон

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp\left(\frac{i \vec{p} \vec{r}}{\hbar} - i \frac{E}{\hbar} t\right)$$

Электрон в атоме водорода

$$\psi = Y_{lm}(\theta, \phi) R_n\left(\frac{r}{a_B}\right) \exp\left(-i \frac{E}{\hbar} t\right)$$

Макроскопические квантовые явления. Магнетизм.

Макроскопические квантовые явления. Сверхпроводимость.

Макроскопические квантовые явления. Сверхтекучесть.

Эффект Шубникова – де Гааза.